



LUBTANE

Gotas Lubrificantes para Ojos.

INSTRUCTIVO DE USO: INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LUBTANE. Gotas Lubrificantes para Ojos.
Aplicar en el ojo
Estéril

Sustancia activa: Contiene 4 mg de polietilenglicol y 3 mg de propilenglicol en cada mL. Otros ingredientes: Hidroxipropil guar, Cloruro de benzalconio, Cloruro de sodio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de zinc, Cloruro de potasio, Ácido bórico, Cloruro de calcio dihidrato, Hidróxido de sodio, Ácido clorhídrico, Agua inyectable.

Lea todo este FOLLETO detenidamente antes de empezar a usar este medicamento porque contiene información importante para usted.

- Guarde este folleto. Es posible que deba leerlo de nuevo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado. No se lo transfiera a los demás.
- Durante el periodo en el que use este medicamento, informe a su médico que usa este medicamento cuando vaya al médico u hospital.
- Cumpla por completo con lo que está escrito en este folleto. No tome una dosis superior o menor que no sea la recomendada para este medicamento.

En este folleto

1. ¿Qué es LUBTANE y para qué se utiliza?
2. Antes de usar LUBTANE
3. ¿Cómo utilizar LUBTANE?
4. Posibles efectos secundarios
5. ¿Cómo almacenar LUBTANE?



1. ¿QUÉ ES LUBTANE Y PARA QUÉ SE UTILIZA?
 LUBTANE es una solución oftálmica que se utiliza como lágrima artificial en los casos en que la humectación de la superficie ocular es defectuosa debido a la falta de lágrimas o composición de las lágrimas o debido al cambio de colocación natural del globo ocular (exoftalmia, lagofthalmia) o exposición a factores externos. Se utiliza como auxiliar en el tratamiento de trastornos del ojo seco y para aliviar el ardor y la irritación.

2. ANTES DE USAR LUBTANE
 Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar LUBTANE.

NO utilice LUBTANE si:
 Usted es alérgico (hipersensible) a cualquiera de los ingredientes enumerados al principio de este folleto.

Tenga especial cuidado con LUBTANE si:
 • Deje de usar el medicamento y consulte a su oftalmólogo si tiene síntomas como malestar duradero, lagrimeo excesivo, dolor de cabeza, cambios en la visión o enrojecimiento o si la irritación de los ojos empeora.
 • No utilice este producto si cambia de color o se vuelve turbio.

Si estas advertencias son válidas para usted, incluso si fue por sólo un periodo en el pasado, consulte a su médico.

Uso de LUBTANE con alimentos y bebidas
 LUBTANE se infunde en el ojo. No utilice el producto de ninguna otra manera. Si el producto se utiliza como se recomienda, no hay interacción con alimentos y bebidas.

Embarazo
 Consulte a su médico antes de usar este medicamento.

Si está embarazada, cree que puede estar embarazada o está planeando tener un bebé, consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento

LUBTANE sólo debe utilizarse cuando sea necesario.

El uso de LUBTANE no tiene ningún efecto esperado sobre la fertilidad.



Durante el tratamiento, si te das cuenta de que estás embarazada, consulta a tu médico inmediatamente.

Lactancia materna
 Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento.
 LUBTANE sólo se utiliza cuando sea necesario.

Conducir y utilizar máquinas
 Este producto (como otras gotas para los ojos) puede causar temporalmente visión borrosa justo después de ser colocado en los ojos. No conduzca, utilice maquinaria ni realice ninguna actividad que requiera una visión clara hasta que esté seguro de que puede realizar tales actividades de forma segura.

Información importante sobre algunos de los ingredientes de LUBTANE
 LUBTANE contiene propilenglicol. Puede causar irritación de la piel.

Uso de otros medicamentos
 Si se van a utilizar otros preparados oculares, deben transcurrir 5 minutos entre cada administración. Las pomadas oculares deben aplicarse en último lugar.

Informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluidos los adquiridos sin receta

3. ¿CÓMO USAR LUBTANE?
 Instrucciones para un uso adecuado y dosis/frecuencia de administración adecuadas:


Siga exactamente las instrucciones del médico para el uso de LUBTANE. Si no está seguro, consulte a su médico.

Cuando es necesario, 1-2 gotas para el ojo o los ojos se aplican en tres pasos.

Vía y método de administración:
 • Sólo para ocular.
 • No lo use si este producto cambia de color o se vuelve turbio.
 • Si se van a utilizar otros preparados oculares, deben transcurrir 5



minutos entre cada administración. Las pomadas oculares deben aplicarse en último lugar.
 • Agitar bien antes de cada uso.
 • Se puede utilizar para el ojo seco causado por lentes de contacto. Aplicar antes de insertar lentes o después de moverla. Aplica en tus ojos y parpadea.
 • Para evitar la contaminación, tenga cuidado de no tocar el gotero usted mismo o sobre cualquier superficie o deje que toque su ojo. Siempre reemplace la tapa firmemente después de cada uso.



1. Abra la tapa de la botella.
2. Retire el anillo que se encuentra debajo de la tapa (ver Figura 3 y Figura 4).
3. Lávese las manos y siéntese cómodamente.
4. Baje el párpado inferior con un dedo limpio hasta que se forme una bolsa entre el párpado y el ojo afectado (ver Figura 5).
5. Acerque la punta del gotero al ojo, pero no lo toque.
6. Presione suavemente la base del frasco para que caiga SOLO UNA gota en el ojo. Luego, suelte el párpado inferior.
7. Presione la esquina del ojo del lado de la nariz con el dedo. Manténgala así durante aproximadamente 1 minuto mientras mantiene el ojo cerrado.
8. Si el médico le recetó el medicamento para ambos ojos, repita los mismos pasos para el otro ojo.
9. Cierre la tapa del frasco.
10. Si la gota no llega al ojo, vuelva a intentarlo.

Diferentes grupos de edad

Uso en niños: Aún no se ha establecido la seguridad y eficacia de LUBTANE en niños.

Uso en personas mayores: Sin uso especial.

Uso en condiciones especiales

No sirve de nada especial.



Consulte a su médico si cree que el efecto de LUBTANE es demasiado fuerte o demasiado débil.

Si utiliza más LUBTANE del que debe:
 Si ha utilizado más LUBTANE del que usted requiere, no se preocupe, el exceso se puede eliminar de los ojos mediante el lavado con agua tibia. No se esperan efectos indeseables.

Si accidentalmente ingiere el contenido de un frasco, no se esperan efectos indeseables.

Si utiliza más LUBTANE del que requiere, consulte a un médico.

Si olvida utilizar LUBTANE
 No te preocupes, solo usa una sola dosis cuando te acuerdes.

No utilice una dosis doble para compensar una dosis olvidada

4. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Como todos los medicamentos, LUBTANE puede causar efectos secundarios en algunas personas con sensibilidad a sus ingredientes.

Los efectos secundarios se enumeran en las siguientes frecuencias:
 Muy frecuentes: afecta al menos a 1 de cada 10 pacientes.
 Frecuentes: afecta de 1 a 10 pacientes de cada 100.
 Poco frecuentes: afecta de 1 a 10 pacientes de cada 1000.
 Raros: afecta de 1 a 10 pacientes de cada 10.000.
 Muy raros: afecta a menos de 1 paciente de cada 10.000.
 Desconocido: no se puede estimar a partir de los datos disponibles.

Los efectos secundarios a continuación mostrados con el uso de LUBTANE y las frecuencias son desconocidas:

Efectos en los ojos: dolor ocular, picazón en los párpados, irritación de los ojos, sensación de objeto extraño en el ojo, enrojecimiento en el ojo, visión borrosa.

Notificación de efectos secundarios: Si tiene algún efecto adverso, incluidos los posibles efectos adversos no enumerados en este folleto, consulte a su médico.

¿CÓMO ALMACENAR LUBTANE?

Mantenga LUBTANE fuera de la vista y del alcance de los niños y en su paquete.
 Conservar a temperatura ambiente por debajo de 25 °C.

Después de abrir el frasco, se debe utilizar en un plazo de 30 días (1 mes). Durante este periodo debe mantenerse a temperatura ambiente por debajo de 25 °C.

Utilícelo de acuerdo con la fecha de caducidad.
 No utilice LUBTANE después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

No utilice LUBTANE si observa algún defecto en el producto y/o su envase. No tire ningún medicamento a través de aguas residuales o residuos domésticos. Pregunte a su médico cómo desechar los medicamentos que ya no utiliza. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

FABRICADO EN TURQUÍA POR:	DEVA HOLDING, A.S. Dumlupinar Mah. Ankara Cad. No. 2, Kartepe-Kocaeli, TR-41250, Turquía.
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	Devatis de México, S. de R.L. de C.V. Calle Olivo S/N, Nave 6B, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, México, México.

REG. No. 0886C2022 SSA



Date: 09.10.24	New Artwork Text on the cover	Size	Lids / Flaps	Formula	Warnings	Price Clipping	Batch No	Registration Number	Registration Address	Manufacturer Address	Solution Production Address	Barcode	2D-Code	Pharmacoce	Color Strips	Printing Colors
Design No: KTP5986KT-01	Others:	R: 04	Size 290 x 150 (h) mm	Colors Pan. Black c												

Paper: 45 g/m²
folded size: 145 x 150 mm
The package insert is delivered folded in the middle.

